



ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
موضوع: فاصله گذاری مناسب در بارداری

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید سلامت مادران در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار یکی از ۱۶ کشور موفق دنیا می باشد و به منظور ارتقای هر چه بیشتر شاخص های مرتبط و بهبود نظام ارائه خدمات سلامت مادران بازنگری دستور عمل های خارج بیمارستانی و بیمارستانی در دست اقدام می باشد.
در همین راستا بر اساس آخرین مستندات موجود، بازنگری دستور عمل فاصله زمانی مناسب دو بارداری به شرح ذیل انجام شده است:

فاصله بین دو بارداری (interpregnancy intervals) که بنا به تعریف از زمان تولد نوزاد زنده تا شروع بارداری بعدی می باشد که مناسب ترین زمان به شرح زیر است:

- در زنان در سنین کمتر از ۳۵ سال: حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه
- در زنان بالای ۲۵ سال بدون هیچ بیماری زمینه ای و عارضه در بارداری قبلی: حداقل ۱۲ ماه
- در صورت استفاده از روش های کمک باروری (IVF و ...): حداقل ۱۲ ماه
- بعد از سقط: هر زمانی که از نظر روحی فرد آمادگی لازم برای بارداری را دارد.
- بعد از پره اکلامپسی: حداقل ۱۸ ماه
- بعد از زایمان زود رس: حداقل ۱۸ ماه

شایان ذکر است مطالب فوق در بازنگری کتاب مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران در قسمت مراقبت های پیش از بارداری درج خواهد شد.

دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت