

جدول محاسبه فوری مقدار داروها برای نوزادان ۰/۵ تا ۴ کیلوگرمی

داروهای کد نوزادی

تجویز	۴ کیلوگرم	۳ کیلوگرم	۲ کیلوگرم	۱ کیلوگرم	۰/۵ کیلوگرم	مقدار*	دارو
تزریق سریع IV/IO شست و شو با ۳ mL نرمال سالین تکرار هر ۳ تا ۵ دقیقه در صورت ضربان قلب کمتر از ۶۰ bpm	مقدار IV: ۰/۰۸ mg حجم: ۰/۸ mL	مقدار IV: ۰/۰۶ mg حجم: ۰/۶ mL	مقدار IV: ۰/۰۴ mg حجم: ۰/۴ mL	مقدار IV: ۰/۰۲ mg حجم: ۰/۲ mL	مقدار IV: ۰/۰۱ mg حجم: ۰/۱ mL	۰/۰۲ mg/kg معادل ۰/۲ mL/kg	اپی نفرین IV/IO غلظت: ۰/۱ mg/mL ۱ mg / ۱۰ mL
تجویز تا دسترسی به رگ تجویز سریع درون ETT بدون نیاز به شست و شو. تهویه با فشار مثبت برای انتشار در ریه‌ها	مقدار ET: ۰/۴ mg حجم: ۴ mL	مقدار ET: ۰/۳ mg حجم: ۳ mL	مقدار ET: ۰/۲ mg حجم: ۲ mL	مقدار ET: ۰/۱ mg حجم: ۱ mL	مقدار ET: ۰/۰۵ mg حجم: ۰/۵ mL	۰/۱ mg/kg معادل ۱ mL/kg	اپی نفرین ETT غلظت: ۰/۱ mg/mL ۱ mg / ۱۰ mL
تجویز طی ۵ تا ۱۰ دقیقه	IV, ۰.۴ mL	IV, ۰.۳ mL	IV, ۰.۲ mL	IV, ۰.۱ mL	IV, ۰.۵ mL	۱۰ mL/kg	نرمال سالین IV کلرید سدیم ۰/۰۹%

* بازه پیشنهادی مقدار درون سیاهرگی / درون استخوانی ۰/۰۳ - ۰/۰۱ mg/kg (معادل ۰/۳ - ۰/۱ mL/kg) است.

بازه پیشنهادی مقدار درون نای ۰/۰۵ - ۰/۱ mg/kg (معادل ۰/۵ - ۱ mL/kg) است.

مقدار پیشنهادی اپی نفرین براساس خواست آسان سازی مقدار برای بازدهی آموزشی است و بیان کننده تأیید هیچ مقدار خاصی از بازه مقدار پیشنهادی نیست. پژوهش‌های بیشتر برای تعیین مقدار بهینه اپی نفرین مورد نیاز است.
IV: درون سیاهرگی، IO: درون استخوانی، ETT: لوله درون نای

(جدول شماره ۱)