

شماره: ۶۵۸/۲۸۶۶  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸  
پیوست: دارد



### معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

موضوع: در خصوص دستورالعمل نحوه مصرف ویال آیوپامیدول شرکت داروپخش - کلیه معاونت های غذا و داروی سراسر کشور

با سلام؛

با احترام، عطف به نامه شماره ۵۲۴۷/۵۶۶۵/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان متبوع، در خصوص دستورالعمل نحوه مصرف ویال آیوپامیدول شرکت داروپخش (پیوست) به استحضار می رساند، جهت پیشگیری از عوارض ناخواسته و ایمنی مصرف فرآورده مذکور، خواهشمند است، دستور فرمائید، نکات مورد تاکید مدیر عامل محترم شرکت داروپخش، در خصوص نحوه صحیح مصرف داروی مذکور، در اسرع وقت به تمامی مراکز درمانی، دارویی و مراکز تصویربرداری تحت پوشش آن معاونت محترم اطلاع رسانی شود.

دکتر نوشین محمدحسینی  
سرپرست کفتر نظارت و پایش  
مصرف فرآورده های سلامت

رونوشت:

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل  
سرکار خانم مهندس حسینی اشپلا سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری  
مدیرعامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش  
سرکار خانم دکتر کریمی رئیس محترم گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت  
جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۶۶۴۶۹۱۲۲ نامبر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)



جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی  
مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

جدید/ عطف/ بازگشت/ پیرو:

موضوع: دستورالعمل نحوه مصرف ویال آیوپامیدول شرکت کارخانجات داروپخش

کلمات کلیدی: دستورالعمل مصرف آیوپامیدول شرکت کارخانجات داروپخش

با سلام و احترام

طبق بررسی های انجام شده در برخی مراکز تصویر برداری در خصوص نحوه مصرف ویال lopamidol 300 & 370 mg/ml شرکت کارخانجات داروپخش مشاهده شده است از تجهیزات یکبارمصرف تزریق مانند تیوب اینجکتور، رابطها و ... که در تماس با دارو می باشند برای چند بیمار استفاده می گردد، ویال پس از باز شدن بلافاصله مصرف نمی گردد و بعضاً باقیمانده محصول در ویال یا اینجکتور برای مریض بعدی استفاده می گردد. لذا با توجه به ماهیت ذاتی محصول و نگرانی بابت تشکیل کریستال و ذره و به جهت تاکید بر رعایت پروتکل تجویز و تزریق این فرآورده دستورالعمل ذیل ارسال و مجدداً مورد تاکید قرار می گیرد:

- ۱- این دارو نباید با هیچ داروی دیگری در حین مصرف مخلوط شود.
- ۲- دارو بلافاصله پس از کشیده شدن در سرنگ یا باز شدن درب ویال باید مصرف شود.
- ۳- این دارو فقط برای یک بار مصرف می باشد، باقیمانده دارو باید دور ریخته شود.
- ۴- از مصرف باقیمانده دارو برای سایر بیماران اکیداً خودداری گردد.
- ۵- باقیمانده دارو که در تماس با اجزای تزریق داروی اتوماتیک بوده بایستی دور ریخته گردد و دستگاه کاملاً پاکسازی گردد.
- ۶- تمامی تجهیزات مصرفی یک بار مصرف که در تماس با دارو قرار گرفته است به هیچ وجه نباید مجدد و برای بیمار دیگر استفاده گردد.

خواهشمند است نسبت به انعکاس موارد فوق به مراکز درمانی و تصویر برداری به طرز مقتضی دستور لازم مبذول فرمائید.

دکتر محمد نادری عزیزاده  
مدیر عامل

دکتر افسانه زمانی  
مسئول فنی فرآورده های  
استریل و بیولوژیک



ارجاع گیرنده \*\*

